



Чистая 99,5% аминокислота L- пролин. Незаменимая аминокислота для обработки обрызгиванием листьев и семян.

Продукт предназначен для уменьшения абиотического и биотического стресса у растений. Регулирует усвоение макро- и микронутриентов и стимулирует природные защитные механизмы растения.

MAXPROLIN содержит аминокислоту L- пролин, очень хорошо усваиваемую растениями.



Основные виды применения MAXPROLIN:

- Весь вегетационный период при холодовом, морозном стрессе, засухе или переувлажнении
- Восстановление ослабленных растений весной
- Подготовка озимых сортов пшеницы к зиме
- Незаменимая аминокислота, вызывающая формирование корневых волосков, участвующих в накоплении азота, увеличивает жизнеспособность пыльцы и всхожесть семян. Регулирует круговорот воды в растении, что способствует лучшему восстановлению после засухи
- Стимулирует образование в растениях хлорофилла "В" типа, это увеличивает эффективность фотосинтеза, что ускоряет восстановление растений после неблагоприятных условий и увеличивает их продуктивность.

Простое использование

MAXPROLIN смешивается с водой из расчета 100 - 300 л воды на 1 гектар. Продукт можно смешивать с любыми видами удобрений, если производителем удобрений не указано иное.

MAXPROLIN наиболее эффективен при неблагоприятных условиях, таких как заморозки, холод, засуха, переувлажнение и т. п.

Одной упаковкой можно обработать 10 га посевов. В упаковке 2 пакета по 10 г каждый.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

Культура	
ПОДСОЛНЕЧНИК	
*внесение в почву перед посевом	-
обработка семян	5-10 г/т
2-3 пары листков	2 г/га
КУКУРУЗА	
*внесение в почву перед посевом	-
обработка семян	5-10 г/т
3-10 листа культуры	2 г/га
СОЯ	
*внесение в почву перед посевом	-
обработка семян	5-10 г/т
от появления всходов до бутонизации	2 г/га
ГОРОХ, ЧЕЧЕВИЦА ТА НУТ	
*внесение в почву перед посевом	-
обработка семян	5-10 г/т
от появления всходов до бутонизации	2 г/га

Культура	
ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ, РАПС ОЗИМЫЙ	
обработка семян	3-5 г/т
*внесение в почву перед посевом	-
внекорневые обработки	
*внесение в грунт перед выходом в трубочку (у рапса перед началом цветения)	2 г/га
внесение в период колосистости	2 г/га
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ	
обработка семян	3-5 г/т
*внесение в почву перед посевом	-
во время кущения или в фазу выхода в трубочку	2 г/га
внесение в период колосистости	2 г/га

Примечание:

* - при необходимости применение возможно в баковой смеси с жидкими удобрениями или с довсходовыми гербицидами, если не указано обратного;



MAXPROLIN: чистая 99,5% аминокислота L- пролин.